

# Egy kreatív matematikaóra

A matematikai kreativitás kialakításához nem feltétlenül szükséges a legmodernebb technikai apparátus. Néha megteszi a fekete tábla és a fehér kréta. Az alkotásra tanítani is lehet, amire most egy konkrét matematikaóra felépítését mutatom be, amit már tíz éve alkalmazok sikeresen.

A számtani-mértani közepek közötti egyenlőtlenség a matematika egyik legfontosabb egyenlőtlensége. Sok matematikus igazolta saját módszerével, így például *Cauchy*, *Liuville*, *Norris*, *Cooper* is. Most a szakirodalomban ismert bizonyításoktól eltérő, saját bizonyítást mutatunk be. Kiindulunk az  $(x_2 - x_1)^2 \geq 0$  egyenlőtlenségből, ami átrendezés után felírható mint  $x_2^2 \geq x_1(2x_2 - x_1)$ . A továbbiakban feltételezzük, hogy  $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ . Ezen feltételek mellett az  $(x_3 - x_2)^2(x_3 + 2x_2) \geq 0$  egyenlőtlenség teljesül, ami átrendezés után felírható a következő alakba:  $x_3^2(3x_3 - 2x_2) \leq x_3^3$ .

Mivel

$$x_3^3 \geq x_2^2(3x_3 - 2x_2) \quad \text{és) } x_2^2 \geq x_1(2x_2 - x_1)$$

ezért

$$x_3^3 \geq x_2^2(3x_3 - 2x_2) \geq x_1(2x_2 - x_1)(3x_3 - 2x_2).$$

Egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül, ha  $x_1 = x_2 = x_3$ .

A matematikai indukció elvét alkalmazva, a fenti két egyenlőtlenségből kiindulva feltételezzük, hogy az  $x_1, \dots, x_{n-1} \geq 0$  jelölés alkalmazásával az

$$x_n^{n-1} \geq x_1(2x_2 - x_1) \dots ((n-1)x_{n-1} - (n-2)x_{n-2})$$

egyenlőtlenség teljesül, valamint egyenlőség akkor és csakis akkor érvényesül, ha  $x_1 = \dots = x_{n-1}$ .

Most igazoljuk, hogy egyenlőségünk öröklődik, azaz teljesül  $n$ -re is, azaz  $x_n^n \geq x_1(2x_2 - x_1) \dots (nx_n - (n-1)x_{n-1})$ , valamint egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül, ha  $x_1 = \dots = x_n$ . Ennek bizonyítása a következő:

$$x_1(2x_2 - x_1) \dots ((n-1)x_{n-1} - (n-2)x_{n-2})(nx_n - (n-1)x_{n-1}) \leq x_n^{n-1}(nx_n - (n-1)x_{n-1})$$

azaz azt kell igazolni, hogy

$$x_n^{n-1}(nx_n - (n-1)x_{n-1}) \leq x_n^n.$$

Átrendezés után

$$nx_n^{n-1}(x_n - x_{n-1}) \leq x_n^n - x_n^{n-1}$$

innen pedig

$$(x_n - x_{n-1})(x_n^{n-1} + x_n^{n-2}x_{n-1} + \dots + x_n^{n-1} - nx_n^{n-1}) \geq 0$$

azaz

$$(x_n - x_{n-1})((x_n^{n-1} - x_{n-1}^{n-1}) + (x_n^{n-2}x_{n-1} - x_{n-1}^{n-1}) + \dots + (x_{n-1}^{n-1} - x_{n-1}^{n-1})) \geq 0$$

Tényezőkre bontva a zárójeleket

$$(x_n - x_{n-1})^2((x_n^{n-2} + x_n^{n-3}x_{n-1} + \dots + x_{n-1}^{n-1}) + (x_n^{n-3} + x_n^{n-4}x_{n-1} + \dots + x_{n-1}^{n-3})(x_{n-1} + \dots + x_{n-1}^{n-2})) \geq 0$$

állításunkat igazoltuk. Egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül, ha  $x_{n-1} = x_n$ . Ezzel igazoltuk a következő tételt: Ha  $x_k \geq 0$ , ( $k = 1, 2, \dots, n$ ), akkor teljesül a következő egyenlőtlenség:  $x_n^n \geq x_1(2x_2 - x_1) \dots (nx_n - (n-1)x_{n-1})$ . Egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül, ha  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ . E szép eredmény legfontosabb alkalmazása a számtani és mértani közepek közötti egyenlőtlenségeknek igazolása.

*Tétel:*

Ha  $a_k \geq 0$ , ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) akkor

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül, ha  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

*Bizonyítás:* Legyenek  $a_k = kx_k - (k-1)x_{k-1}$ ,  $a_k = x_k$ , ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) A számítások elvégzése után  $x_k = \frac{1}{k} (a_1 + a_2 + \dots + a_k)$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ). Ezt behelyettesítve az előző tételben a kívánt eredményt kapjuk. Egyenlőség akkor és csakis akkor teljesül az első tételben, ha  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ , azaz  $a_1 = \frac{1}{2} (a_1 + a_2) = \dots = \frac{1}{n} (a_1 + a_2 + \dots + a_n)$ . Megoldva ezt az egyenletrendszert azt kapjuk, hogy  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ .

A fenti egyenlőtlenségek történelmi háttérének tanulmányozására, valamint alkalmazásukra és újak szerkesztésére a megadott irodalmat különösen ajánlom.

## IRODALOM

Pólya G. – G.H. Hardy – J.E. Littlewood: *Inequalities*, Cambridge, 1952.

Mitrinović D.S.: *Analitičke nejednakosti*, Beograd, 1970.

BENCZE MIHÁLY

# Szakedolgozatok 1993

## Az ELTE TTK levelező technikaszkos végzett hallgatók záródolgozatai II.

Kádas László: *Papírkészítés – papírgyártás*

*(Egy gyártástechnológia fejlődése)*

A szerző a papíripari szakképesítést továbbfejlesztve készítette el a szakdolgozatát. A személyéhez közel álló téma feldolgozása során felhasználta az ipari tapasztalatait. Jól választotta meg rendezőelveit, a rész és egész viszonyát. Technikatörténeti szempontból is érdekes technológiai lépésekre is felhívja a figyelmet, jelezve, hogy a kínai papírgyártás ősi lépései számos esetben nagyon sok hasonlóságot mutatnak a mai modern technológiákkal. A kínaiak is 72 mveleti lépésre bontották papírgyártást. A technológiák összehasonlíthatósági szempontjainak figyelembevételével a szerzőnek 15 művelettípusra sikerült bontani.

A dolgozat megemlíti a környezetbarát technológiák és az újrafelhasználás lehetőségeit. Nem kell már erdőket pusztítani, a fehéritést hidrogénperoxiddal is meg lehet oldani. A művelettervekben egyre gyakoribbak lesznek a leágazások, az anyag visszaforgatások. A technológiához használatos vegyszerek regenerálással visszaforgathatók, a környezetkárosítás eltűrhető színre csökkenthető (rostsűrűs, a hulladék besűrítve és semlegesítve pl. útépítési töltelék anyagként elhelyezhető).

Szántainé Zelencsuk Ilona: *A biotechnológia fejlődése*

A technológia legújabb ágának fejlődését dolgozta fel a szerző. A történeti áttekintésnél a súlypontot a géntechnológia fejlődésére helyezi.

A 3. fejezet a géntechnológiai alapfogalmakat foglalja. Jól gyűjtötte össze a szakirodalomban található legjobb minőségű magyarázó ábrákat is. A negyedik részben a gén-